

Les Infections Sexuellement Transmissibles

LA SYPHILIS



La syphilis, c'est quoi ?

La syphilis est une infection sexuellement transmissible **très contagieuse**. Elle est causée par une bactérie : le tréponème pâle.

Il est possible d'être atteint de la syphilis sans le savoir. En effet, certaines personnes développent des symptômes et d'autres non.

Quels sont les symptômes ?

2 à 4 semaines après la contamination une plaie indolore (chancre) peut-être présente au niveau de la zone de pénétration de la bactérie (sur le pénis, à l'intérieur du vagin, dans la bouche...).

Puis des boutons et/ou des plaques peuvent apparaître sur la peau et les muqueuses.

Comment se faire dépister ?

Une simple prise de sang suffit pour détecter l'infection.

Elle se positive dans le mois suivant la contamination mais un délai de 3 mois est recommandé pour affirmer l'absence de syphilis.

L'infection par la syphilis est actuellement en pleine recrudescence : Protégez-vous !

Comment ça se transmet ?

- Par contact sexuel (oral, anal, vaginal, pénis)
- Par contact avec une lésion de la peau (le chancre est très contagieux)
- Par le sang (partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogues)
- Par transmission de la mère à l'enfant

Comment se protéger et protéger les autres ?

- Préservatif ou carré de latex pour les pénétrations et le sexe oral
- Éviter tout contact avec les lésions de la peau
- Se faire dépister des IST régulièrement, notamment si vous avez plus d'un(e) partenaire sexuel(le)

Attention :

En l'absence de traitement, des complications graves peuvent survenir jusqu'à de nombreuses années après la contamination (atteinte des organes et/ou du cerveau).

Au moindre doute, faites-vous dépister.

Toute personne de **moins de 26 ans** peut se faire dépister **gratuitement** et **sans ordonnance** dans tous les laboratoires du réseau.



11 avenue Leclerc de Hauteclocque - 57010 Metz

Tél. : 03 87 55 03 69

nouscontacter@lesbiologistesindependants.fr

lesbiologistesindependants.fr